

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES RHONE-ALPES

AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE

**ARBO. VITI. RHONE-ALPES**

ABONNEMENT ANNUEL: 90f

REGISSEUR RECETTES D.D.A. CCP LYON 9431-17A



Circonscription RHONE-ALPES

55, rue Mazenod 69426 LYON CEDEX 3

8 Février 1985

N° de série continue 291

Bulletin n° 3

## ARBRES FRUITIERS

PSYLLE : C'EST LE MOMENT  
CLOQUE : C'EST POUR BIENTÔT  
TRAITEMENTS D'HIVER : C'EST ENCORE TEMPS

### PSYLLE DU POIRIER

L'évolution de la maturité des femelles a été très rapide à la faveur des températures actuelles. L'examen des derniers lots en Laboratoire nous montre que les 50 % de femelles fécondées prêtes à pondre sont dépassés ou presque atteints partout. De plus, les infestations semblent importantes cette année.

En conséquence, le traitement est à

effectuer dès réception par bel après-midi (température supérieure à 7°). Rappelons que c'est ce traitement qui est le plus déterminant de la saison pour la lutte contre ce parasite.

Les produits à employer sont les huiles jaunes à la dose du fabricant, mais qui doivent contenir au moins 600 g/hl de DNOC. En rajouter donc, si besoin est.




### CLOQUE DU PECHER

Les bourgeons de pêchers n'ont pas évolué pour le moment, excepté en ce qui concerne la variété Armking dans le Sud de la Circonscription. Cependant, il est à craindre si les températures actuelles se maintiennent, qu'une rapide évolution intervienne. Il est donc nécessaire d'examiner attentivement les yeux à bois terminaux pour décider de la date de traitement.

Ce traitement est le seul valable dans la lutte contre cette maladie et les contaminations ultérieures en dépendront.

Les produits utilisables sont :

- le zirame à 180 g de matière active/hl
- le thirame à 175 g de m.a./hl
- le ferbame à 175 g de m.a./hl
- le captafol à 120 g de m.a./hl

	Le bourgeon s'allonge légèrement	TROP TOT
	Au centre des écailles, on peut apercevoir la pointe verte ou rougeâtre de la première feuille en regardant par dessus.	BON MOMENT
	La pointe verte (figurée en noir sur le dessin) s'allonge et se dégage légèrement des écailles. Elle est visible même lorsqu'on examine le bourgeon perpendiculairement à son axe.	TROP TARD

75-12

### TEIGNE DES FLEURS DE CERISIER

L'emploi des colorants nitrés (DNOC) à la dose de 600 g à 1 kg/hl, en ce moment, contre ce parasite, constitue la méthode la plus

efficace, à condition de bien effectuer la pulvérisation, et bien mouiller les extrémités.

### TRAITEMENTS D'HIVER DES ARBRES FRUITIERS

La période actuelle est encore idéale pour effectuer les traitements indiqués par le précédent Bulletin : le climat actuel favorise les applications sur une végétation qui n'a pas encore bougé.

## **VIGNE**

Pensez aux traitements d'hiver et aux mesures prophylactiques (voir notre dernier Bulletin).

		
NON MOMENT		
		